



Chancroide

¿Qué es el chancroide?

El chancroide es una infección bacteriana que pueden contraer tanto los hombres como las mujeres.

¿Cómo se transmite el chancroide?

El chancroide se transmite al estar en contacto con las úlceras o llagas de una persona con chancroide mientras se practica sexo vaginal, anal u oral.

¿Cuáles son los síntomas del chancroide?

Los síntomas pueden incluir llagas en la piel, abiertas, supuratorias y dolorosas, así como también ganglios linfáticos inguinales inflamados y dolorosos. Las llagas, por lo general, comienzan como pequeñas protuberancias de color rojizo, entre 4 y 7 días después del contacto sexual con una persona infectada. Estas úlceras crecen y se profundizan, y pueden ser muy dolorosas o sangrar. Cuando las úlceras se encuentran en la vagina, es probable que usted sienta dolor o que sangre durante el coito, o que le sea doloroso orinar. Cuando las úlceras se encuentran en el recto, la deposición intestinal puede ser dolorosa o venir con sangre.

¿Cómo puedo saber si tengo chancroide?

Su médico o proveedor de servicios de salud recolectará una muestra de flujo de la úlcera con una pequeña torunda o tapón (*swab*) y la hará analizar en un laboratorio.

¿Cómo se trata el chancroide?

Los antibióticos pueden curar el chancroide. Una vez que haya tomado toda su medicación, acuda nuevamente a su médico para asegurarse de que las llagas sanaron y que no hay rastros de la infección.

¿Qué sucede si no se trata el chancroide?

Si no se le trata, el chancroide puede causar lesiones graves en la piel y en los genitales. Como otras ETS, si no se le trata, el chancroide también puede facilitar el contagio con el VIH o su transmisión. Si tiene síntomas o piensa que tiene chancroide, hágase examinar y obtenga tratamiento inmediato para evitar complicaciones.

¿Deben recibir tratamiento las parejas sexuales?

Sí. Si le diagnostica una infección de chancroide, es importante comunicárselo a todas las personas con quienes tuvo relaciones sexuales en los últimos 10 días, para que también puedan examinarse y tratarse. Tome *todos* los medicamentos según le indiquen, aun cuando se sienta mejor antes de haber terminado el medicamento. No tenga relaciones sexuales hasta que usted y las personas con las que tuvo relaciones sexuales completen el tratamiento y todos los síntomas hayan desaparecido, o podrían reinfectarse.

(continúa en al reverso)



Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York
Michael R. Bloomberg, *Alcalde*
Thomas R. Frieden, M.D., M.P.H., *Comisionado*

Chancroide, *Continuación*

¿Y si estoy embarazada?

No se conocen consecuencias graves para el bebé cuando se tuvo chancroide durante el embarazo. No obstante, hágale saber a su proveedor de servicios que usted se encuentra embarazada si piensa recibir tratamiento por chancroide.

Todas las mujeres embarazadas deben realizarse cuanto antes los análisis para detectar la presencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS o STDs — sexually transmitted diseases), incluyendo el VIH. Debe volverse a analizar durante el embarazo si está expuesta a un riesgo mayor de contagio de una ETS. Por ejemplo, está expuesta a un riesgo mayor si tiene una nueva pareja durante el embarazo, o si tiene más de una pareja. Si no se tratan, las ETS pueden ser devastadoras para el bebé. Para protegerse y proteger a su bebé contra el VIH y otras ETS, use un condón de látex siempre que tenga relaciones sexuales.

¿Cómo puedo evitar el chancroide?

Los condones de látex pueden servir para prevenir la transmisión del chancroide, pero sólo si el condón cubre o protege el área infectada. Si hay contacto con una llaga abierta, el chancroide puede transmitirse a las áreas que no están protegidas por el condón.

Una manera de evitar las infecciones de transmisión sexual es no tener relaciones sexuales. Si *lleva una vida sexual activa*, puede reducir su riesgo de contraer chancroide así como la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH, sólo mediante una relación sexual mutuamente monógama con una pareja que, con seguridad, no está infectada. Adopte estas medidas para reducir el riesgo de contagio de las ETS si tiene una vida sexual fuera de esta relación:

1) Usa siempre un condón de látex (u otro tipo de barrera de látex) cuando tiene sexo – vaginal, anal u oral. Los condones fabricados con materiales “naturales”, como piel de cordero, protegen del embarazo, pero no de las enfermedades de transmisión sexual. Si es alérgico al látex, puede usar condones de poliuretano u otros materiales sintéticos.

2) Limita la cantidad de personas con las que tiene sexo. Cuantas más parejas tenga, mayor será el riesgo.

3) Evita el alcohol y las drogas cuando tiene sexo. Si bebe o usa drogas, le resultará más difícil recordar usar condones para protegerse y proteger a los demás. Para obtener ayuda gratuita y confidencial sobre el abuso de sustancias, llame al 1-877-AYÚDESE (1-877-298-3373), o simplemente al 311.

Más información

Se ofrecen exámenes y tratamiento gratuitos y confidenciales para las ETS, asesoramiento y evaluación del VIH confidenciales o anónimos en las clínicas del Departamento de Salud ubicadas en los 5 distritos (*boros*) de la ciudad de Nueva York. NO se requiere seguro de salud, comprobante de ciudadanía ni el consentimiento de los padres. Para obtener una lista de las clínicas y horarios, visite nyc.gov/health, o llame al 311.

